

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO

Arp Beauty

Tamaño: Medio.

Forma: Disimétrica, aovada-acorazonada con un labio un poco más desarrollado.

Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice acuminado, con mamelón muy pequeño de base ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto.

Sutura: Superficial excepto en su tercio superior que forma surco. Hendida en la cavidad peduncular.

Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda.

Piel: Velloso de pubescencia poco abundante y corta. **Color:** Domina igualmente el amarillo anaranjado del fondo y el rojo oscuro negruzco de la chapa que en un tercio de la superficie es muy compacta con reflejos violáceos y no deja transparentar el fondo. El resto con punteado, manchas y estrías que en zonas considerables desaparecen totalmente.

Carne: Blanda, amarilla, sin coloración alrededor del hueso. Jugosa y pastosa, dulce. **Sabor:** Bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente; surco dorsal ancho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie arenosa, poco esculpida con orificios pequeños y profundos y con surcos cortos. Polo peduncular cerrado.

Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

